

Fruitiers à pépins

Ce qu'il faut retenir

Anthonyme du poirier : Emergences des adultes en cours sur l'ensemble de la région. Le risque de ponte augmente en Indre et Loire.

Semaine 37

Parcelles de référence observées
Poiriers : 6 dont 4 parcelles en production biologique

Départements : Indre et Loire, Loiret

Nos partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration des BSV Arboriculture région Centre - Val de Loire sont les suivantes :

La FREDON Centre – Val de Loire, le COVETA, la Station d'Expérimentations Fruitières de la Morinière, Tech'Pom, les Fruits du Loir, la Reinette Fruitière, Arbo Loire Service, le groupe ORIOUS, la Société de Pomologie du Berry, la Martinoise, ainsi que des producteurs, observateurs indépendants ou adhérents à ces groupements et des jardiniers amateurs (et passionnés !).

Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre Val de Loire
13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture du Centre Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et de l'écologie avec l'appui financier de l'agence française de la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2.

Poiriers

Anthomome d'hiver du Poirier (*Anthonomus pyri*)

Description dans le BSV Arboriculture n°35 du 07/09/2017

Etat général

Les niveaux de population restent bas en général dans nos parcelles de référence. Toutefois, dans quelques parcelles du Loiret et d'Indre et Loire, nous avons observé la présence de dégâts notables au printemps dont les effets peuvent se cumuler avec une alternance de la floraison des poiriers.

Situation

Des observations (basées sur 100x3 frappages) ont été réalisées cette semaine dans 6 parcelles d'Indre et Loire et du Loiret ayant présenté des dégâts d'anthonomes du poirier au printemps 2017. Aucun anthomome n'a été constaté dans 4 parcelles (St Branchs, Chanteau, St Hilaire St Mesin), et **entre 1 et 2 adultes ont été observés dans deux parcelles** (la Chapelle aux Naux, St Hilaire St Mesmin). Les émergences d'adultes d'anthonomes se poursuivent mais ne s'intensifient pas encore.



Anthomome d'hiver du poirier (*Anthonomus pyri*)
Photo : FREDON CVL - M Chariot

Il est important de noter que les anthonomes des poiriers s'alimentent et pondent de préférence pendant les heures qui précèdent l'aube. Cette activité peut se prolonger encore pendant les premières heures du jour.

Prévision et évaluation des risques

Le risque de ponte est actuellement **élevé en Indre et Loire**, dans les parcelles fortement attaquées au printemps dernier. Le risque reste **faible** dans les secteurs moins précoces tels que le Loiret.

Surveiller les parcelles à risque : il est important de maintenir les observations par battages de rameaux (100x3 coups - de préférence en matinée) dans les parcelles à risque

Prochain Bulletin le jeudi 21/09/2017