

Colza

CHARANÇON DE LA TIGE

Contexte d'observations

Suite au bulletin N° 20 d'hier, les captures se poursuivent sur l'ensemble de la région.

Depuis lundi, sur 94 parcelles observées, 58 ont enregistrées une présence d'insectes (cf. carte ci-dessous).

Les valeurs extrêmes vont de 1 individu piégé à plus de 400. La moyenne sur les parcelles avec captures est de 28 individus.

Le maintien des conditions climatiques actuelles est toujours favorable à l'activité du charançon de la tige. Proplant confirme que l'activité devrait se maintenir pour les 3 jours à venir.

Les maturations sexuelles des femelles de charançons de la tige réalisée ce jour par le FREDON Centre, la FDGDON 36 & 37 indiquent que l'activité de ponte peut débuter ou pourra débuter dans les prochains jours dans le sud de la région (37,36,18 et dans un deuxième temps secteur est 45). Le modèle Proplant confirme ces éléments.

Pour la zone nord (Nord 41, 28), la maturation n'est pas assez avancée pour permettre l'activité de ponte avant la fin de la semaine (cf. carte ci-dessous), ceci est en lien avec les captures tardives observées sur ces secteurs.

Pour le 41 et le 28, les prochaines maturations permettront de confirmer l'évolution de la maturation.

Bulletin rédigé par le CETIOM en collaboration avec la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRALYS, AGRIAL, AGRICULTEUR, AGRICULTEUR-IMMÉDIA CA36, AGROPITHIVIERS, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CAPROGA, CETIOM, COC, COOP BONNEVAL, EPIS CENTRE, EPLEFPA CHARTRES, ETS DAUGER, ETS DUPRÉ LARDEAU, ETS ECHIVARD, FDGEDA DU CHER, LEPLATRE SA, NUTRIPHYT, PIONEER SÉLECTION, RESEAU AA - ETS PHILIPPON, SA PISSIER, SCAEL, TERRENA, UCATA et FREDON CENTRE, FDGDON 36, FDGDON 37


Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture du Centre, rédigé en collaboration avec l'ensemble des partenaires et validé par le comité de rédaction.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Annexes

Localisation des observations


Réseau Colza 2009-2010



Nombre de Charançons de la tige du colza


- 0
- 1 à 5
- > 5

★ Parcelle sans observation



Localisation des observations

Réseau Colza 2009-2010



Maturation Charançon de la Tige



- % femelles maturation ovarienne non engagée
- % femelles sans "œufs" de taille définitive
- % femelles avec "œufs" de taille définitive, oviductes communs vides
- % femelles prêtes à pondre (des "œufs" dans les oviductes communs)
- % femelles ayant déjà pondu (oviductes distendus)

