

Colza

RESEAU 2009 - 2010

Le réseau est en cours de mise en place.

La base comporte actuellement 26 parcelles, 13 parcelles ont fait l'objet d'un relevé d'observation cette semaine.

La présence d'altises des crucifères est la seule observée cette semaine.

La grande majorité des semis sont à ce jour effectués. Les conditions sèches actuelles ne sont pas favorables aux levées. Les parcelles du réseau ne sont pas levées.

ALTISE DES CRUCIFERES

Contexte d'observations

5 parcelles ont fait l'objet d'un relevé de cuvette, la présence de petites altises est observée dans seulement 2 cuvettes.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles. **Surveiller en priorité les bordures de parcelles.**

La destruction des repousses de colza dans les parcelles avoisinantes conduit à déplacer les insectes sur les cultures en cours de levée. Dans la mesure du possible reporter la destruction de ces repousses et attendre que les nouveaux colzas aient atteint au minimum 2 feuilles.

Seuil de nuisibilité

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative.

PHOMA

Contexte d'observations

Pour l'automne 2009, les informations phoma seront issues des 3 types d'informations différentes : pièges dynamiques, pièges passifs et suivi de la maturation des périthèces.

La mise en place des pièges dynamiques et passifs sur l'ensemble de la région sera conditionnée à l'évolution de la maturation des périthèces (Fredon - Loiret, Fdgdon37 - Indre-et-Loire, EpisCentre & Cetiom - Cher) combiné avec les 2 pièges dynamiques d'Epis Centre et du CETIOM (Cher).

Observations

Le temps secs du mois d'août n'a pas été favorable à la maturation des périthèces donc aux projections des ascospores.

- Suivi maturation des périthèces : absences de périthèces.

- Pièges des ascospores sur pièges dynamiques : Aucune projection de spores enregistrées.