

Colza

RESEAU 2009 - 2010

La base comporte actuellement 52 parcelles, 32 parcelles ont fait l'objet d'un relevé d'observation cette semaine. Suite aux dernières pluies, les cultures sont en cours de levée : 39% des parcelles ne sont pas levées, les autres sont au stade A (stade cotylédonnaire).

La présence des insectes est très discrète sur les parcelles du réseau.

ALTISE DES CRUCIFERES

Contexte d'observations

Aucune capture d'altise des crucifères. Une seule observation de dégât sur feuilles. Les conditions climatiques des prochains jours sont favorables à l'activité de cet insecte.

Attention, retarder la destruction des repousses des anciennes parcelles de colza pour éviter la migration des altises des crucifères vers les nouveaux colzas en cours de levée.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.

Seuil de nuisibilité

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative.

ALTISE D'HIVER

Contexte d'observations

Aucune capture d'altise d'hiver lors des dernières observations.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles dans le cadre du risque adultes.

Seuil de nuisibilité

→ 8 pieds sur 10 portant des morsures.

TENTHREDE DE LA RAVE

Contexte d'observations

Une seule observation d'adulte de la tenthrède de la rave est enregistrée cette semaine.

Attention, la capture des adultes dans les pièges sur végétation n'est pas un indicateur pertinent vis-à-vis du risque mais un indicateur d'alerte.

Période de risque

→ depuis la levée jusqu'au stade 6 feuilles mais généralement plutôt entre 3 et 6 feuilles en cas de population larvaire importante.

Seuil de nuisibilité

→ présence de larves avec des dégâts sur feuilles supérieurs au ¼ de la surface végétative.

PHOMA

Observations

Les dernières pluies n'ont pas permis pour l'instant la maturation des périthèces et donc la projection d'ascospores.