

Colza

RESEAU 2009 - 2010

37 parcelles du réseau ont fait l'objet d'au moins une observation lors des derniers jours.

STADE DES COLZAS

Toutes les parcelles du réseau sont actuellement au stade G4. Les premières graines colorées apparaissent dans les parcelles les plus avancées (début du stade G5).

PUCERON CENDRE

Contexte d'observations

Aucune évolution de la présence du puceron cendré dans les 35 parcelles ayant fait l'objet d'une observation.

Période de risque

De mi-floraison jusqu'à la fin du stade G4.

Seuil de nuisibilité

2 colonies présentes par m² de culture.

Dernier Bulletin de Santé du Végétal concernant le colza
sauf contexte spécial

Tournesol

RESEAU 2010

Le réseau est actuellement constitué de 23 parcelles, 13 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine.

STADE DES TOURNESOLS

Stade atteint (50% des plantes)	% des parcelles
A2	0%
B1-B2	15%
B3-B4	15%
B5	15%
B6	8%
B7	8%
B8	0%
B9	15%
B10	8%

PUCERONS

Contexte d'observations

6 parcelles du réseau révèlent la présence de pucerons verts du prunier et/ou de pucerons noirs de la fève. Les premières crispations de feuilles sont observées.

2 parcelles atteignent le seuil de nuisibilité de 10 % de plantes crispées.

La présence des auxiliaires est signalée notamment les coccinelles.

Période de risque

De la levée à la formation du bouton floral.

Seuil de nuisibilité

Plus de 10 % des plantes avec des symptômes marqués de crispation

AUTRES

La présence de chenilles défoliaitrices est signalée sur 2 parcelles du réseau.

Des dégâts divers et variés sont renseignés dans la base : limaces, noctuelles, taupins, oiseaux, gibiers.